醫書論

七情六慾
腹瀉說
淋症說
肺癆說
肺癰說
中風論
汗出論
濕熱下注
失血論
瀉血論
五積論
瘡種
痰嗽
痢疾
傷寒
中風
風寒溼為痹
癰疽症

通[illegible]論

[illegible]藥十注論

六大論

中風論

[illegible]癥論

[illegible]痰論

淋痢論

鼓脹論

七情[illegible]論

[illegible]直惑

風寒濕合痹

中風

[illegible]虛

[illegible]疾

[illegible]痢

[illegible]

直[illegible]論

論五臟之竅舌為心之竅（手少陰）目為肝之竅（足厥陰）口為脾之竅（足太陰）鼻
為肺之竅（手太陰）耳為腎之竅（足少陰）

論六腑之竅驚其屬足少陽膽居其屬手少陽三焦吐其屬足陽
明胃泄其屬手陽明大腸煩燥其屬足太陽膀胱真陽其
屬手厥陰張命門

論相（間）表理心與小腸為表理肺與大腸為表理肝與膽
為表理脾與胃為表理腎與膀胱為表理

論五臟相生相尅
心為脾母脾為肺母肺為腎母腎為肝母肝為[illegible]

毋此係五行順行之論病業宜實則瀉其子虛則
補其母
論五行之〻礼東方甲木其色青其味酸其臟肝主筋
南方之丙丁火其色赤其味苦其臟心心主血
西方庚辛金其色白其味辛其臟肺肺主氣
中央戊己土其色黃(其味甘)其臟脾脾主肉
北方壬癸水其色黑(其味鹹)其臟腎腎主骨

論七情六鬱諸氣鬱血鬱氣血痰火濕食為六鬱

七情者喜怒憂悲思恐驚

論陰陽氣血心生血為陰營也又經言君火小腸相火

肺主氣屬陽為衛也陰陽二氣並行通流而成

脈察百病均以脈為準也

小便清者身雖熱而內實寒　宜用溫藥

舌無津液芒刺口有津液亦屬寒

小便赤者身雖寒而內湿熱

舌生芒刺口無津液亦屬熱　宜用涼藥

舌胎白者丹田有熱胸中有寒

舌胎黑係熱皆係陰虛

舌胎黃者有熱聚于胃中

內熱

津液有為寒

舌胎黑者寒熱皆有

無津液為熱

七情六慾飲食作勞者為內傷傷于風寒暑濕食者為外感
內傷發熱時熱時止外感發熱熱甚無休內傷惡寒得
煖便解外感惡寒絮火不除內傷頭痛作痛作歇外
感頭痛連痛無停內傷則手心發熱外感則手背發熱內
傷則口淡無味外感則鼻塞不通內傷則氣口脈盛多
屬不足宜溫宜補宜和外感則人迎脈盛多屬有余宜吐
宜汗宜下蓋左人迎主表右氣口主裏也凡外感傷風傷
寒發熱咳嗽手緊不輕易表散宜用蘇梗秦艽前胡
柴胡用一二味羌活防風亦不可重用也 此東垣治內傷

外感暑邪證人治外感而從內傷也故藥用反而殺人多矣

又偏頭痛者左屬風與血右屬白也痰熱與氣虛 腦痛屬胃虛也

又氣帶痰精白痰風寒知不同

論泄瀉凡水瀉者濕也腹痛腸鳴而瀉者火也痛甚而瀉瀉而痛減者食也完穀不化氣虛也、在傷寒下利則為邪熱不殺穀也、火瀉名為脾瀉腎虛而命門火衰不能生土也、大腸虛而作瀉者宜豁痰、有傷風泄瀉者宜發散風藥、

如脾虛泄瀉者宜用 而求之藥補脾也

腸泄者又有用補滲則亦效用通滲[illegible]利藥亦不效何也丹溪曰宜用升提之曰氣升則水自降經曰地氣上為雲天氣下為雨天地不交則萬物不生矣

屎淋血……
淋大小乙……熬成（煎）
石非事……肝経也
氏淋者宜……便不利
氣不口……心胃氣結（憂思痰火虛寒）
治肺癰……寒痰
熱痰二……氣深

九味羌活用防風細辛蒼芷與川芎黃芩生地同甘草
三陽解表益薑葱
藿香正氣大腹蘇甘桔陳苓厚朴朮建麯白芷加
姜棗感傷嵐瘴并能驅
噎膈反胃應陳皮白朮厚朴有神麯木香檳榔
茯苓蔻砂紅香附加青皮
麯
麯

肺清火肺痿者乃係正氣虛不可用豁痰之藥慎治殺人矣
如治肺癰者宜用豁痰之藥開提升散為專肺癰為邪實

外感日最詳恐人治外感而治內傷也故藥用反而殺人多

矣又論肚痛左屬風與血右屬兼食痰熱與氣虛臍痛屬腎虛也

又氣帶痰精白濁風寒知否同

論泄瀉凡水瀉者濕也腹痛腸鳴而瀉者火也痛甚而瀉瀉而

痛減者[illegible]外熱不

積穀也[illegible]也

大腸虛[illegible]散風

藥[illegible]

腸潤者[illegible]芥提

又有用補[illegible]

之日氣壯[illegible]又州萬

物不生[illegible]

茯苓 白芍 香附 甘草 枳[illegible] 神麯 神麯

當歸 白芍 陳皮 白朮 厚朴 香附 神麯 山楂 枳殼

羌活[illegible] 白朮[illegible] 蒼朮[illegible]

藿香 黃芩 猪苓 澤瀉[illegible] 甘草 陳皮 白芍 厚朴 木通 神麯 白芷 川[illegible]

三黃 蘇葉 麻黃 乾薑 乾葛

白朮 羌活 防風 茯苓[illegible] 白芷 當歸 川芎 白芷 甘草

尿淋血即血淋也色鮮者為心與小腸色瘀者腎與膀胱淋去如石子之硬者名為石淋也乃肝經移熱于胞中日久熬成煎石非專心腎小腸膀胱也石淋者宜用牛膝之葉酸苦而入肝經也凡淋者宜用通氣清心平火之葉利濕不宜用補藥也有小便不利小氣不足之者宜稍以補藥也又有血淋作痛為血淋不痛者為尿血思慮氣結或憂思房勞虛寒

治肺痿者感于風寒咳嗽氣短聲鼻塞胸脹久而成痿有寒痿熱痿二症寒痿宜用　熱痿宜用麥冬宜養血補氣保肺清火肺痿者乃保正氣虛不可用豁痰之葉損傷人矣

如治肺癰者宜用豁痰之葉開提升散為專肺癰為邪實

咳嗽者午前嗽者多屬胃火宜石膏知母芩連梔黑午後嗽者屬

日輕夜重者多屬陰虛宜四物五味子麥冬知母等嗽者不同有

因寒因食因痰因虛王不同也有咳嗽胃苗者宜用丹皮地骨皮的

嗽而復瀉者為肺移熱于大腸也嗽而發熱不止者為陰虛也

凡陰虛勞嗽者通用款冬花為正有乾嗽者係火鬱在肺胸膈刺痛

火鬱在上從

治中風非係外來之風良由心火暴甚腎水虛衰則心為氣 卒

自病中風大法有四一曰偏枯半身不遂二風痱（四肢不收）三風癔奄

忽不知人也四風痺諸風類痺狀也風癔晝笑此諸風皆由

氣血虧虛宜用養血益氣固本之藥是也

汗出之説、汗出雖為心液、然而五藏皆有汗、飲食飽甚汗出於胃、驚而奪精汗出于心、持重遠行汗出於腎、疾走恐懼汗出于肝、搖體勞苦汗出于脾、

凡有濕熱流于肢節之间者、腫属濕、痛属熱、汗多属風、麻属氣虚、木属濕痰死血、十指麻木亦是胃中有濕痰死血、脾主四肢故也、痛風當分新久、新痛属寒用　藥、久痛属熱宜用涼藥、又云暴病非属熱、久病非属寒也、此類之病宜用

順氣清痰搜風散湿養血去瘀為要為有手足不遂者宜用
威靈仙圣藥也

失血論 嗽血者血隨唾出 咯血者隨痰咯出或帶血絲出腎經及肺經
自兩脇送上者吐出者屬肝經 衄血者血溢于腦從鼻而出 咳血者
咳出痰內有血並屬肺經 吐出嘔出成盆成碗者皆屬胃經
經漏不止曰崩 血熱則妄行 宜以涼藥

下血論 血鮮者隨感而見為腸風血 瘀者積久而發 若臟
毒 糞前為近血出于腸胃宜清熱 糞後者為遠血出于肺肝宜散風涼血

論……左脇肺積
日……在胃脘右側
治……加補脾胃之
藥……諸之積屬
屬……之氣也書白

鴻豐號

先世而後病者胃病移与腎則重也

先病而世者有腎病移与胃

積是積聚是聚也不可一論而治凡有積聚在不論在何竅作

痛者用手按之痛甚而實也宜用下藥化血之痛時用手按之痛

止者而為虛痛宜用補藥也

順氣清痰搜風散濕養血去痰爲要爲有手足不遂者宜用
威靈仙聖藥也

失血論

唾血者血隨唾去咯血者隨痰咯去或帶血絲去腎經及肺經
自口[illegible]爲肝經衄血者血溢于腦從鼻而出去咳血者
咳[illegible]屬胃經
痰[illegible]發者臟
庀[illegible]肝　宜散風
毒[illegible]月　涼血

論五積之說心積曰伏梁起臍上至心下。肝積曰肥氣在左脇。肺積
曰息賁在右脇。腎積曰奔豚在小腹上至心下。脾積在胃脘右側。奔豚係風寒濕客于腎家
治之不宜常用藥恐損真氣用藥總宜破血行氣加補脾胃之
藥氣壯方能磨積正旺則邪自消也 又曰積久成形謂之積乃
屬脹血也或食也或痰也聚者常有常無而為陽者是氣也書曰內傷
積是積聚是聚也不可一論而治凡有積聚不論在何竅作
痛者用手按之痛甚而實宜用下藥死血者痛時用手按之痛
止者而為虛之痛宜用補藥也

凡有瘡腫𠀋凡腫而痛者為實邪腫而不痛者虛邪腫而赤者為結熱腫而不赤者為留氣停痰經曰諸瘡痛癢皆屬心火

凡有痰嗽者主于脾濕故為脾生痰（脾無濕而不能生痰）之源肺為貯痰之器按
有聲無痰曰欬此傷于肺氣也有痰無聲曰嗽此為脾濕也
有痰有声曰嗽（咳）者或因火因風因寒因濕因虛勞因食積宜
分症論之大法治嗽當宜治痰為先順氣為主咳無形痰有形無
形則潤有形則燥如風寒濕食諸痰宜用半夏（半夏）南星陳皮
風痰用南星（散風）前胡寒痰用乾姜（熱藥）濕痰用蒼术（燥藥）白朮茯苓熱痰宜
用黄芩瓜蔞燥痰用貝母脾家濕痰用半夏為末夏不治勞痰
失血者用反能加病又有三禁血家汗家渴家忌用虛痰用只殼
白术

痢疾 先痢而後泄者為腎傳脾易 先泄而後痢者

為脾傳腎難療 此症在脾者病淺 在腎者病深

如赤痢者係陽盛陰衰 如白痢者係陰盛陽衰 如不

膿血者赤白者係正氣虛邪氣盛 故見此症

噤口痢則為脾虛亦屬熱閉胞膕所致

傷寒數傳經論

去起傷寒者即傷于四時之氣皆能為病曰毒則寒毒傷
肌膚至夏至則溫病夏至後則為熱病熱病傷寒數也
傷寒一日足太陽受病脈浮故項痛腰脊强二日陽明受之
故身热目痛而鼻乾不得卧也三日足少陽故胸脇痛
而耳聾三陽經絡皆受其病而未入于藏者故可汗而已
四日太陰受之陽極而陰受之也故腹滿而嗌乾也

五日少陰受之故口燥舌乾而渴六日厥陰受之故煩滿
而囊縮三陰三陽五藏六腑皆受病榮衛不行五藏
不通則死病矣
一日太陽少陰俱病則頭痛口乾而煩滿也
二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫言
三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人
則六日死

中風岐伯曰大法有四一曰偏枯半身不遂也。二曰風痱四肢不收也。三曰
癔奄忽不知人也。四曰風痺。諸風類痺狀也。風症盡矣此症皆由氣
而虧血虛宜養血益氣固本之為要也不可用羌活等類以退風則病不去
甚愈虛

風寒濕為痺風勝為行痺寒勝為痛痺濕勝為着痺在于骨
體重在脉則血濡在筋則拘攣在肉則不仁

癱瘓
癱從六腑生瘓從五藏生皆陰陽相滯而成氣為陽血為陰血
行脉中氣行脉外相並周流寒濕搏之則凝滯而遲不及

火熱搏之則沸騰而行速為太過火鬱邪入血中為陰滞于陽血鬱

邪入血氣中為陽滞于陰致生悪瘡遂百病皆由起也

腰者腎之府轉移不能腎將憊矣

膝者筋之府屈伸不能筋將憊矣

仲景治傷寒皆。無汗用黄麻。有汗用桂枝者何也。未有究其精微者。津液
在于內則為血。在外則為汗。寒傷血。而血內濇。則不能外通。故無汗。發熱惡寒而而用麻黄者也。
非寒傷于氣。氣外泄。而不能內護于血。故氣血虛弱。故有汗發熱。而惡風然而
風寒皆由皮毛所入。皮毛者肺也。故有咳嗽胸滿。故用麻黄桂枝。引去血分之邪也。

治小兒痰壅喉而不能服药用白礬打碎用水活成餅貼在小兒脚心上一日而痰自消灵驗之極

治痔漏灵驗用麝香一分冰片一分蚊蝟皮一个真象牙一个合成餅用次膏药貼在患處一日換二三次十日外收消痔管者可以能去

小兒項上生核乃係痰湿用次膏药一張用潮腦放在膏药上貼之即愈灵驗極矣

脈見五只而為緩數實濕熱心肺皆數相火微沉而細似有若無
而為心腎不交夜不得眠飲食則少倦怠
又心火太盛必少食肝火太盛必克脾土
如心肺沉數而大相火極小似有若無腎脈無比右尺微
雖壯點此症主於心腎不交飲食則少體倦怠夜不
得眠

痔漏屬于大腸與肺為表裏肺氣移熱于大腸故腸
風痔漏治清藏熱則腑亦清矣

婦人姙娠脈

左寸大左尺大右寸小必男

右寸大右尺亦大左寸小必女

論氣血令人血充則實血少則濇諸經則長養衰竭百脈由此空虛血盛則形盛

血弱則形衰血者難成而易虧不可不謹養血傷則氣傷氣血一傷諸病立至

故血有妄行逆行于上則吐衄妄于下則腸風衰涸于內則虛勞枯槁于外消

瘦移熱膀胱則溺血滲虛傷搏則崩漏濕蒸熱瘀則血淋火極似水則色黑熱蘊于

滲發為瘡瘍濕滯于血則為癮疹凝濇于皮膚則為冷痺畜血在上則善忘

畜血在下則如狂跌仆損傷則瘀惡內聚此皆失于攝養變為諸病也

月經先期為熱後期為寒有寒則凝而月水不行

有成塊者氣之滞凝將行而痛者氣之滞行後作痛者氣血兩虛色淡氣血

兩虛錯經妄行氣之亂如紫者氣之熱色黑者熱之甚也

失血方用側伯地黄 当帰茅根丹皮

桃仁红花大小薊 條芩藕節荷葉灰

左寸脉小左尺弦右寸脉浮大右尺弦症係風温咳嗽

左寸脉小左尺弦小右寸脉大右尺弦小症係傷寒

左寸月

浮而有力多風熱　浮而無力是血虛
寸浮頭痛弦生風　或有風痰聚在胸
關浮土衰兼木旺　尺浮溲便不流通
沉而有力寒并積　沉而無力虛與氣
寸沉痰鬱時水停胸　關沉中寒痛不通
尺沉濁遺并泄痢　腎虛腰及下元痌
遲而有力為冷痛　遲而無力定虛寒
寸遲必是上焦寒　關遲中寒痛不堪
尺遲腎虛腰腳重　溲便不禁疝氣丸

數而有力[illegible]數（為實在）而無力是虛火 寸數咽喉口舌瘡吐紅

嗽咳肺生瘍 關數胃火并肝火 尺數滋陰降火湯

（寸）滑膈痰生嘔吐吞酸舌強或咳嗽 關滑宿食脾熱[illegible] 胃寒熱

尺滑少腹必停水淋有水

尺滑少腹必停水

左寸關之脈浮緩為濕（風）在血分 右寸關浮緩風濕在氣分

左脈三部屬血 右三部屬氣分

肝膽之引藥

柴胡 前胡 俱係屬于散風之藥

前胡但柴胡性情能升而不能降 平肝胆之邪熱

前胡性入肝胆之藥能降而不能升 瀉肝經之熱

左人迎脈盛係外傷于風右尺脈必弦

右氣口脈盛傷于食右關脈必滑

今診婦人脈見此脈兩寸動兩關脈沉而有力為左尺脈沉滑此脈

乃係少腹停水血虛之症

凡下牙齒齦屬手陽明大腸府係大腸風熱居多宜用秦艽專能去下牙痛

秦艽散風去熱之要藥專入足陽明胃經 手陽明大腸

葛根專入陽明胃經之藥專能發陽明之汗

白芷專入陽明胃經之藥而為胃經之主藥 手太陰肺經

無汗發熱為惡寒乃係風傷于氣氣外泄不能內護于血故而血虛津液不固

有汗發熱為惡風乃係風傷入于皮毛繇入于肺故皮毛外閉則風邪內攻宜用麻黃桂枝引入血內散邪

* R601
I27
1800Z

McGILL
UNIVER-
SITY
LIBRARY

1457345

bea2890

#428001252

中国书店（收）
1
25.— 元